



FUNGICIDA TERAPICO PARA  
TRATAMIENTO DE SEMILLAS

GRUPO 3 GRUPO M3

# 25:25 FENDER MIX

SUSPENSIÓN CONCENTRADA  
PARA EL TRATAMIENTO DE SEMILLAS

Composición:

|   |                     |
|---|---------------------|
| carbendazim: 2-metoxicarbamoil-bencimidazol.....    | 25 g                |
| tiram: disulfuro de bis (dimetiltiocarbamoílo)..... | 25 g                |
| coadyuvantes, inerte y colorante c.s.p .....        | 100 cm <sup>3</sup> |

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscrito en SENASA con el N° 40.592

Lote N°:  
Fecha de vencimiento:

Contenido neto:  
Industria: Argentina.

**NO INFLAMABLE**



Juan B Justo - (757) – Jesús María - Córdoba

**NOTA:** No estando ni el almacenamiento ni su aplicación bajo el control de nuestra firma, no nos responsabilizamos ante daños de ningún tipo por el uso distinto al indicado en esta etiqueta.



FUNGICIDA TERAPICO PARA  
TRATAMIENTO DE SEMILLAS

GRUPO 3 GRUPO M3



# 25:25 FENDER MIX

SUSPENSIÓN CONCENTRADA  
PARA EL TRATAMIENTO DE SEMILLAS

## PRECAUCIONES

- **MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.**
- **NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.**
- **INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.**
- **EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO.**
- **EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.**
- **PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.**

**MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES:** Este producto es nocivo si es ingerido o absorbido por la piel. Evitar todo contacto con la piel, ojos y ropa.

**Para su seguridad durante la preparación y aplicación:** Utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. No comer, beber, ni fumar durante el manipuleo del producto. Evitar el contacto con el pulverizado. No destapar picos ni boquillas con la boca.

**Para su seguridad después del tratamiento:** Cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante de **25:25 FENDER MIX** en su envase original, bien cerrado.

**RIESGOS AMBIENTALES:** **Virtualmente no tóxico para las abejas.** Avisar a los apicultores cercanos por el cierre de colmenas previo a la aplicación. **Moderadamente tóxico para peces.** No contaminar fuentes o cursos de aguas. **Prácticamente no tóxico para aves.** El producto no presenta riesgos para el medio ambiente si se usa siguiendo las recomendaciones de este marbete, pues no se espera exposición del producto por tratarse de un terapico para el tratamiento de semillas.

**TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN:** Preparar la cantidad de producto que se va a utilizar, evitando remanentes. El remanente se podrá reutilizar en otra oportunidad. El caldo remanente no se podrá volver a utilizar, el mismo debe ser eliminado en forma segura, sin contaminar aguas cercanas. Se puede volver a aplicar este nuevo preparado sobre barbechos, caminos y áreas no cultivadas ni pastoreadas, evitando cercanías con centros poblados y lugares de tránsito frecuente de personas.

**TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS:** Los envases vacíos no pueden volverse a utilizar. Respetar las siguientes instrucciones para el Triple Lavado Norma IRAM 12.069: Agregar agua hasta cubrir un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos. Luego verter el agua del envase en el recipiente dosificador (considerar este volumen de agua dentro del volumen recomendado de la mezcla). Realizar este procedimiento **3 veces**. Finalmente, inutilizar el envase perforándolo e intentando no dañar la etiqueta al efectuar esta operación. Los envases perforados deben colocarse en contenedores para ser enviados a una planta especializada para su destrucción final. No enterrar ni quemar a cielo abierto los envases y demás desechos.

**ALMACENAMIENTO:** Mantener el producto en su envase original cerrado, en un lugar seguro, fresco, seco y al resguardo de la luz solar, ubicado fuera del alcance de personas inexpertas y animales. No transportar ni almacenar con alimentos, fertilizantes, otros plaguicidas y semillas. Evitar almacenar a temperaturas por encima de 35 °C.



FUNGICIDA TERAPICO PARA  
TRATAMIENTO DE SEMILLAS

GRUPO 3 GRUPO M3

# 25:25 FENDER MIX

SUSPENSIÓN CONCENTRADA  
PARA EL TRATAMIENTO DE SEMILLAS

**DERRAMES:** Cubrir los derrames con material absorbente (tierra o arena). Barrer el producto absorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

**PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación, acudir inmediatamente al médico.**

**Inhalación:** Trasladar a la persona afectada al aire fresco. Si la respiración es dificultosa, dar oxígeno. Si no respira, realizar respiración artificial. Mantener a la persona afectada en reposo y abrigada.

**Piel:** Quitar la ropa contaminada y lavar la piel, los cabellos y las mucosas con agua y jabón o con agua bicarbonatada (diluir un sobre de bicarbonato de sodio en un litro de agua).

**Ojos:** Inmediatamente lavar los ojos con suero fisiológico o agua limpia en forma continuada durante por lo menos 15 minutos.

**Ingestión:** No inducir el vómito. Enjuagar la boca con abundante agua limpia. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.

**ADVERTENCIA PARA EL MEDICO:**

**PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO (CLASE III).**

**IRRITACIÓN DERMAL: LEVE IRRITANTE (CUIDADO) CATEGORIA IV. IRRITACIÓN OCULAR: MODERADO IRRITANTE (CUIDADO) CATEGORIA III: Causa irritación moderada a los ojos. No sensibilizante. Aplicar tratamiento sintomático y de sostén.**

**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA:** En caso de ingestión es probable la presencia de vómitos y diarreas. No es irritante en piel y mucosas.

**ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES:** No posee.

**CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACION:**

**CENTRO TOXICOLÓGICO PERMANENTE (todo el año, 24 horas por día):**

**CAPITAL FEDERAL:**

- Unidad toxicológica del Hospital Municipal de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel.: (011) 4962-6666 / 2247.

- Hospital de Clínicas. Universidad de Buenos Aires. Tel.: (011) 5950-8804 / 06 y (011) 5950-8000

**BUENOS AIRES:**

- Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas, Haedo. Tel.: (011) 4658-7777 y (011) 4654-6648

**CORDOBA:**

- Hospital de Niños. Tel: (0351) 458-6400

- Hospital de Urgencias. Tel: (0351) 427-6200.

**COMPATIBILIDAD TOXICOLÓGICA:** No existen antecedentes de sinergismo aditividad o potenciación para los ingredientes activos que componen este producto formulado.



FUNGICIDA TERAPICO PARA  
TRATAMIENTO DE SEMILLAS

GRUPO 3 GRUPO M3

# 25:25 FENDER MIX

SUSPENSIÓN CONCENTRADA  
PARA EL TRATAMIENTO DE SEMILLAS

## RECOMENDACIONES DE USO:

**GENERALIDADES DEL PRODUCTO:** 25:25 FENDER MIX es un fungicida floable de acción sistémica y de contacto para el tratamiento de semillas destinadas a la siembra.

25:25 FENDER MIX protege a la semilla por fuera y por dentro contra los hongos del suelo y de la semilla, aumentando el porcentaje de germinación y consecuente rendimiento del cultivo.

La acción fungicida del tiram, como activo de cobertura, se complementa con la propiedad de traslación del carbendazim, permitiendo un control integral.

## INSTRUCCIONES PARA EL USO:

**PREPARACIÓN:** Para una correcta preparación de la dilución respetar las siguientes instrucciones:

- Agitar el envase antes de utilizar el producto.
- Agregar agua al recipiente en donde se preparará la mezcla, respetando una relación agua-producto.
- Añadir luego la cantidad necesaria de 25:25 FENDER MIX, según la cantidad de semillas a tratar. Mezclar y corroborar la adecuada dilución del producto.

**Importante:** Mantener la agitación durante todo el tiempo de uso. La dilución debe ser usada dentro de las 24 horas luego de preparada. **Usar siempre agua limpia.**

**EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN:** 25:25 FENDER MIX es una suspensión concentrada para ser aplicada sobre las semillas. Para obtener una buena protección del cultivo, es indispensable distribuir el producto homogéneamente, asegurando que cada semilla quede cubierta adecuadamente.

A las dosis indicadas de 25:25 FENDER MIX agregar agua en la cantidad necesaria para lograr una aplicación fluida sobre las semillas. La cantidad de agua por cada 100 kg de semilla a tratar varía entre 0.5 a 1 litro, según el grado de sequedad de la simiente. Verter el producto en el tambor rotativo o giratorio con aletas fijas interiores, lleno de semilla hasta la mitad de su capacidad. Mezclar durante unos minutos y completar con el resto de semilla, volviendo a mezclar por unos minutos más. **AGITARSE ANTES DE USAR.**

Para Papa semilla ver indicaciones específicas en el ítem Recomendaciones de Uso.

## RECOMENDACIONES DE USO:

| CULTIVO                                   | ENFERMEDAD   | DOSIS                              |
|---|--|------------------------------------|
| ALFALFA                                   | Damping off y Complejo de hongos del suelo<br>( <i>Fusarium sp</i> , <i>Rhizoctonia sp</i> , <i>Pythium sp</i> , <i>Mucor sp.</i> ,<br><i>Diplodia sp.</i> ) | 400 cm <sup>3</sup> /qq de semilla |
| ARVEJA                                    |  | 250 cm <sup>3</sup> /qq de semilla |
| LENTEJA<br>MANI<br>DESCASCARADO<br>POROTO |  | 120 cm <sup>3</sup> /qq de semilla |



FUNGICIDA TERAPICO PARA  
TRATAMIENTO DE SEMILLAS

GRUPO 3

GRUPO M3

# 25:25 FENDER MIX

SUSPENSIÓN CONCENTRADA  
PARA EL TRATAMIENTO DE SEMILLAS

|                                   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|
| <b>SOJA<br/>TRIGO</b>             |   |   |
| <b>SOJA</b>                       | <p>Cancro del tallo<br/>(<i>Diaporthe phaseolorum</i><br/><i>var. meridionalis</i>)<br/>(controla al patógeno que<br/>está en la semilla, no<br/>previene de un ataque<br/>posterior a campo)</p> | 240 cm <sup>3</sup> /qq de semilla  |
| <b>TRIGO<br/>CEBADA<br/>AVENA</b> | <p>Carbón volador<br/>(<i>Ustilago tritici, var. nuda</i>)<br/>Caries o carbón hediondo<br/>(<i>Tilletia sp.</i>)<br/>Fusariosis o Golpe blanco<br/>(<i>Fusarium sp.</i>)</p>                     | 120 cm <sup>3</sup> /qq de semilla  |
| <b>PAPA SEMILLA</b>               | <p>Punta seca o marchitez<br/>(<i>Fusarium sp.</i>)<br/>Costra negra<br/>(<i>Rhizoctonia sp.</i>)</p>   | <p>Preparar una suspensión<br/>de 500<br/>a 625 cc de SOWER<br/>PLUS en<br/>100 litros de agua.<br/>Colocar la<br/>suspensión en un tanque<br/>o piletón<br/>y sumergir los cortes<br/>durante 5<br/>minutos. Al reponer el<br/>líquido<br/>gastado, hacerlo con una<br/>concentración 10% más<br/>alta que la<br/>original. No utilizar el<br/>baño por más de dos días<br/>pues comienza a<br/>degradarse por la<br/>suciedad de la papa.<br/>Rendimiento: con 1000<br/>litros de<br/>este baño se pueden<br/>tratar 400-<br/>500 bolsas.</p> |



FUNGICIDA TERAPICO PARA  
TRATAMIENTO DE SEMILLAS

GRUPO 3 GRUPO M3

# 25:25 FENDER MIX

SUSPENSIÓN CONCENTRADA  
PARA EL TRATAMIENTO DE SEMILLAS

## RESTRICCIONES DE USO:

**Atención:** La venta de semilla curada para otro destino que no sea la siembra está penada por la ley. La ley 18073 prohíbe terminantemente la mezcla de semilla tratada con este producto, con granos destinados al consumo humano o animal. Comprobada la presencia de curasemillas (fungicidas o insecticidas), la ley dictamina el decomiso y multa. Piense que una sola bolsa de semilla curada mezclada en varios silos de granos para el consumo es suficiente para que la mezcla sea venenosa para la alimentación humana o animal y por lo tanto los infractores serán severamente penados.

**Periodos de carencia:** Exento para el uso como terapico para semillas.

“En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia”.

**COMPATIBILIDAD:** Cuando se desea realizar mezclas con otros productos para el tratamiento de semillas, hacer pruebas de compatibilidad previamente. Siempre preparar cada producto por separado y luego aplicarlo a las semillas.

**FITOTOXICIDAD:** A las dosis recomendadas no se presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados.

**AVISO DE CONSULTA TECNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRON**