

FERTILIZANTE BIOLÓGICO

GRUPO 1

GRUPO M3



AVANTBIO NORTE

LIQUIDO

FENDER PACK

PARA EL TRATAMIENTO DE 2.000 KG DE SEMILLA DE SOJA

COMPOSICION BROQUEL FENDER MIX I:

metalaxil-M: metil N-(metoxiacetil)-N-(2,6-xilil)-D-alaninato 1 g
fludioxonil: 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-il)-1H-pirrol-3-carbonitrilo 2,5 g
solvente, coadyuvantes y colorante c.s.p. 100 cm³

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscrito en SENASA con el N° 41.287

COMPOSICION INOCULANTE AVANT BIO:

Bradyrhizobium japonicum (cepa E109 INTA)
Contiene 1 x 10¹⁰ bacterias viables/mL a la fecha de elaboración y 1 x 10⁸ bacterias viables/mL al vencimiento.

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscrito en SENASA con el N° 21.495

COMPOSICION TIAMETOXAN FENDER:

tiametoxam: 3-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-[1,3,5]oxadiazinan-4-ilideno-N-nitroamina 35 g
coadyuvantes, colorante y solvente c.s.p. 100 cm³

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscrito en SENASA con el N° 40.552

Lote N°: Ver en el envase

Fecha de vencimiento: Ver en el envase

Industria Argentina

Presentación:

2 botellas x 1 L de BROQUEL FENDER MIX I
1 vejiga x 2 L de INOCULANTE AVANT BIO
2 botellas x 1 L de TIAMETOXAN FENDER

Cont. Neto: **6 lt.**

NO INFLAMABLE



PRO CROP S.A.

Juán B Justo 757 - Planta Alta - OFICINA 5
X5220ABA - Jesús María - Córdoba - Argentina
TE: +54 9 3525 691018 - www.fenderagro.com

PRECAUCIONES

- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS
- INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.
- EN CASO DE INTOXICACION LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO
- EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES
- PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

PRIMEROS AUXILIOS: Si hubo contaminación, quitarse la ropa y lavar bien la piel con agua y jabón. Por salpicaduras en piel, enjuagar con abundante agua y jabón durante 15 minutos como mínimo. Si se contaminan los ojos, lavar con abundante agua limpia por 15 minutos. En caso de inhalación, trasladar a la persona al aire fresco. Si no respira, suministrar respiración artificial. En caso de ingestión, brindar asistencia médica de inmediato, llevando el marbete del envase, no administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. No administrar leche, crema u otras sustancias que contengan grasas. Si el vómito se produce naturalmente, mantener a la persona afectada sentada e inclinada hacia delante. En todos los casos procurar asistencia médica y mostrar el envase con la etiqueta del producto.

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: Ligeramente peligroso (Clase III). Toxicidad inhalatoria: Categoría III - CUIDADO. Irritación dermal: Leve irritante dermal (CUIDADO) - Categoría IV.

Irritación ocular: Severo irritante ocular (PRECAUCIÓN) - Categoría II: Causa daño temporal a los ojos. Aplicar tratamiento sintomático.

(Carbendazim), Ditiocarbamatos (Tiram)

SINTOMAS DE INTOXICACION AGUDA: Por ingestión, pueden manifestarse síntomas de envenenamiento agudo, como náuseas y vómitos, cefaleas. Afecta al sistema nervioso central. Puede causar irritación ocular.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez: Tel. (011) 4962-6666 y 4962-2247. Sección Toxicológica del Hospital de Clínicas de Buenos Aires: Tel. (011) 5950-8804/06 int. 480. Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico A. Posadas: Tel. (011) 4654-6648 y 4658-7777. Hospital de Niños de Córdoba: Tel. (0351) 4233303/4229961. TAS - Toxicología, Asesoramiento y Servicio: (0341) 424-2727.

AVISO DE RESPONSABILIDAD LEGAL: PRO CROP SA no se responsabiliza por los efectos y/o resultados que deriven de no haberse ajustado estrictamente a las especificaciones del presente rótulo.



CIUDADO

