



INSECTICIDA - CRUSTACICIDA

GRUPO 4A

BB TOX X-TRA

CEBO GRANULADO

Composición:

acetamiprid:(E)-N1-[(6-cloro-3-piridil)metil]-N2-ciano-N1-metilacetamidina	1,6 g
Inertes c.s.p	100 g

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscrito en SENASA con el Nro.: 41.635

Lote Nro.:

Contenido Neto:

Fecha de Vencimiento:

Industria Argentina

INFLAMABLE



HUAGRO S.A.

Av. Corrientes 2554
Piso 1ro B
Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

Nota: la empresa se responsabiliza por la composición del producto hasta la fecha de su vencimiento. No se hace responsable por daños o perjuicios que puedan derivarse de un uso distinto al indicado en este rótulo.



CUIDADO



INSECTICIDA - CRUSTACICIDA

GRUPO 4A

BB TOX X-TRA

CEBO GRANULADO

PRECAUCIONES:

- **MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS**
- **NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.**
- **INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.**
- **EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE ESTA ETIQUETA AL MEDICO.**

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES

Evitar su inhalación y el contacto con la piel y los alimentos. Usar guantes, gafas y máscara facial, botas de goma y ropa protectora adecuada para su aplicación. No emplear sin previo lavado, ropa que haya tenido contacto con el producto en tratamientos anteriores. Finalizado el tratamiento, lavarse con agua y jabón, todas las partes del cuerpo expuestas al producto.

RIESGOS AMBIENTALES

El producto es prácticamente no tóxico para aves. El producto es prácticamente no tóxico para peces. Producto virtualmente no tóxico para abejas. Evite contaminar fuentes de agua con el producto.

TRATAMIENTO DE REMANENTES

Todos los remanentes deben ser recolectados para su destrucción, de modo tal que ofrezcan la máxima garantía para la salud humana y el ambiente.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS

Una vez limpios los envases vacíos eliminarlos en un incinerador aprobado para químicos o recurrir a un servicio especializado en residuos de plaguicidas y envases vacíos.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un sitio cubierto, seco y en estibas pequeñas, separadas del piso, en su envase original cerrado. No Transportar ni almacenar con alimentos o ropas.



INSECTICIDA - CRUSTACICIDA

GRUPO 4A

BB TOX X-TRA

CEBO GRANULADO

DERRAMES

En caso de producirse derrame barra y recoja con una pala el material vertido y deposite en un recipiente el cual deberá ser etiquetado inmediatamente, el mismo deberá ser enviado a una empresa habilitada para su destrucción. Posteriormente lavar el área afectada con abundante agua.

PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con la piel: sacar inmediatamente la ropa afectada y contaminada. Enjuagar y lavar con agua en forma de ducha, jabonado suave con jabón común y nuevo lavado con agua.

Contacto con los ojos: lavar inmediatamente con agua mediante ducha ocular con jeringa durante 15 minutos como mínimo desde el ángulo interno del ojo hacia fuera (remover lentes de contacto si hubiera y fuera fácilmente realizable) luego control por oftalmólogo.

Ingestión: Lavado de boca y urgente traslado a centro asistencial.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: PRODUCTO QUE NORMALMENTE NO OFRECE PELIGRO. CLASE IV. IRRITACION OCULAR: Leve irritante ocular (CUIDADO) CATEGORIA IV. IRRITACIÓN DERMAL: No irritante (CUIDADO) CATEGORÍA IV. Aplicar tratamiento sintomático.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Los síntomas más frecuentes son adormecimiento, picazón y hormigueo de la piel, y vértigo en ocasiones se ha descrito un eritema papular o maculoso. La mayor parte de esos síntomas son temporales y desaparecen en 5 -7 días. No se han comunicado efectos a largo plazo.



INSECTICIDA - CRUSTACICIDA

GRUPO 4A

BB TOX X-TRA

CEBO GRANULADO

ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: No posee.

Consultas en caso de intoxicación

Capital Federal Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños Dr. R. Gutiérrez Tel: (011) 4962-6666/2247. **Hospital de Clínicas de Cap. Federal. Centro Toxicológico:** Tel (011)5950-8804/06 **Buenos Aires Haedo: Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas** Tel: (011) 4654-6648 y 4658-7777. **Córdoba Hospital de Niños:** Corrientes 643 Tel: (0351) 421-5303 **Rosario: Hospital de Niños de Rosario** Tel: (0341) 430-3533 ó 481-3611/3612. **T.A.S. CASAFE** (0341) 448-0077 ó 424-2727.

COMPATIBILIDAD TOXICOLÓGICA: No se conocen antecedente de potenciación, aditividad o sinergismo.



INSECTICIDA - CRUSTACICIDA

GRUPO 4A

BB TOX X-TRA

CEBO GRANULADO

GENERALIDADES:

BB TOX X-TRA es un cebo granulado de última generación especialmente formulado en base a Acetamiprid, que actúa por ingestión, para el control de BICHO BOLITA (*Armadillidium vulgare*) en cultivos de soja y otras leguminosas, girasol, maíz, trigo y colza, especialmente recomendado para situaciones de cultivos realizados bajo la modalidad de SIEMBRA DIRECTA

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

Modo de aplicación: Se recomienda realizar la aplicación al voleo con esparcidoras centrífugas especialmente diseñadas para este uso, que permitan distribuir la dosis recomendada en forma pareja y uniforme en todo el lote. El momento de aplicación y la dosis a utilizar dependerán de los datos recolectados durante el monitoreo. Los mejores resultados se han obtenido con la aplicación previa a la siembra o al momento de realizar la misma, para lograr de esta forma un excelente control de la plaga antes de la germinación, lo que es considerado un punto crítico para el correcto establecimiento del cultivo y la obtención de la densidad adecuada de plantas en el lote.

Recomendaciones de uso:

Cultivos	Plaga	Dosis (kg/ha)	Momento de aplicación
Soja y otras leguminosas, girasol, maíz, trigo, colza	Bicho bolita (<i>Armadillidium vulgare</i>)	3 – 5 (*)	Previo a la siembra o al momento de realizar la misma.

(*) Se recomienda el uso de las dosis mayores en caso de altas poblaciones de “bicho bolita”, condiciones del lote y/o ambientales predisponentes, o toda otra situación que haga más agresiva la presencia de la plaga sobre el cultivo.



INSECTICIDA - CRUSTACICIDA

GRUPO 4A

BB TOX X-TRA

CEBO GRANULADO

Para obtener los mejores resultados con **BB TOX X-TRA** se recomienda efectuar el monitoreo de los lotes previo a la siembra para determinar la dosis correcta de producto y así lograr un adecuado control de Bichos Bolita (*Armadillidium vulgare*) y mantener el nivel de los mismos por debajo del umbral de daño económico.

RESTRICCIONES DE USO:

Por sus recomendaciones de uso y aplicación posicionada, no presenta periodo de carencia.

COMPATIBILIDAD:

Por su especificidad, se recomienda su aplicación en forma independiente de cualquier otro producto fitosanitario o fertilizante

FITOTOXICIDAD: Por su aplicación posicionada, no directamente al follaje y antes de la emergencia del cultivo no presenta síntomas de fitotoxicidad.

AVISO DE CONSULTA TECNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO